

Zagrożenie pryszczycą - ważne informacje dla hodowców



Zagrożenie pryszczycą - ważne informacje dla hodowców

W związku z potencjalnym zagrożeniem wystąpienia pryszczycy - wysoce zaraźliwej choroby wirusowej zwierząt - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kolbuszowej udostępnia materiały informacyjne dotyczące zasad bioasekuracji.

Zwracamy się z prośbą do hodowców zwierząt oraz wszystkich osób mających kontakt ze zwierzętami gospodarskimi o zapoznanie się z załączonymi ulotkami i przewodnikiem. Przestrzeganie zasad bioasekuracji jest kluczowe dla ochrony zdrowia zwierząt oraz ograniczeniu strat ekonomicznych wynikających z zachorowań.

1 TRANSMISJA

Pryszczycą jest jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zwierząt parzytkoopytnych.

Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przeniesienia i rozprzestrzenienia się choroby, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przynieść wirusa.

Możliwe jest przeniesienie pryszczycy wraz z mlekiem, rogowym i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt, które nie zostały poddane odpowiedniej obróbce.

2 ZAPOBIEGANIE

Wprowadzenie do gospodarstwa zwierząt o nieznanym stanie zdrowia stanowi bardzo duże zagrożenie dla całego stadu. Wskazane środki zapobiegawcze jest wpisane do różnych chorób (jest różnorodnym i najłatwiejszym sposobem ochrony stadu).

UNIKAJ:

- Zakażonych zwierząt, materiałów (rowny, sprzęt, pojazdy) pochodzących z niewiadomego źródła;
- Kontaktów między zwierzętami z różnych stad (np. na pastwisku, hodowli) w celu zapobiegania rozprzeczce;
- Odstawiania innych hodowli zwierząt bez zachowania zasad bioasekuracji;
- Wspólnego używania narzędzi, sprzętu i pojazdów wykorzystywanych w innych gospodarstwach.

STROŻ:

- Oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- Oddzielne i obowiązkowe do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- Oddzielne i obowiązkowe do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- Oddzielne i obowiązkowe do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;

3 ŚWIADOMOŚĆ

Choroba może spowodować: bezpodstępnie i podstępnie straty ekonomiczne. Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie wszystkich zwierząt. Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić właściwym władzom.

Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego odciążenia choroby.

Pryszczycą (FMD)

Choroba

Pryszczycą to choroba zwierząt parzytkoopytnych udomowionych i wolno żyjących (w tym bydło, owce, kóz, świń, wielbłądów, bawołów, jeleni). Powoduje powstanie pęcherzy głównie w jamie ustnej i na kończynach. Objawy u zakażonych zwierząt: obfite ślinienie, młaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronięcia.

U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, kozłąt, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.

Transmisja

Pryszczycą jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przeniesienia i rozprzestrzenienia się choroby, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przynieść wirusa. Możliwe jest przeniesienie wirusa wraz z mlekiem, miazgą i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt. Może wystąpić przeniesienie drogą kropelkową (obecność wirusa w śrocie).

Zapobieganie

Ryzykowne zachowania zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia. Wskazane środki zapobiegawcze jest wpisane do różnych chorób i jest najlepszym sposobem ochrony stadu.

Ochrona stadu w przypadku podejrzenia wystąpienia ognisk choroby w pobliżu:

Unikać:

- kontaktów między zwierzętami z różnych stad, np. na pastwisku, przez ogrodzenia);
- zwiedzania innych miejsc, w których przebywają zwierzęta;
- korzystania ze wspólnych narzędzi, sprzętu, pojazdów, personelu z innymi gospodarstwami.

Stroż:

- oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- oddzielne i obowiązkowe do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- dezynfekcję obuwia przed wejściem do budynku ze zwierzętami.

Szczepionki przeciwko pryszczycy są dostępne i muszą być stosowane wyłącznie z instrukcjami służb weterynaryjnych.

Świadomość

Choroba może powodować różne bezpodstępnie i podstępnie straty ekonomiczne. Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie wszystkich zwierząt. Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej. Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzeczce choroby.