



mutacji i przejście w wysoce zjadliwą grypę ptaków:

- o objawy kliniczne wahają się od niezauważalnych do umiarkowanych lub ciężkich objawów oddechowych;
- o śmiertelność waha się od 3% do 15%;
- o produkcja nieśna może spaść o 45%.

## 2. Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI - Highly pathogenic avian influenza)

- o objawy kliniczne to depresja, silne łzawienie, kichanie, duszność, obrzęk zatok podoczodołowych, sinica grzebienia i dzwonków, obrzęk głowy, nastroszenie piór, biegunka, objawy nerwowe;
- o gwałtowny spadek lub zatrzymanie produkcji jaj, skorupy miękkie, ostatnie jaja zwykle bez skorup;
- o w nadostrych i ostrych przypadkach padnięcia są nagłe, bez widocznych objawów lub w ciągu 24-48 godzin od pierwszych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

### **Zgłoszenie podejrzenia**

#### **Drób**

Posiadacz drobiu powinien zawiadomić [powiatowego lekarza weterynarii](#) albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

- zwiększona śmiertelność;
- znaczący spadek pobierania paszy i wody;
- objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
- duszność;
- sinica i wybroczyny;
- biegunka;
- nagły spadek nieśności.

#### **Ptaki dzikie**

**Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich** zgłaszają [powiatowemu lekarzowi weterynarii](#) albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

**Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, zgodnie z [ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt](#) jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.**

**Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Kolbuszowej  
lek. wet. Marek Olszowy**