

## Tabletki z jodkiem potasu- działania prewencyjne



Tabletki z jodkiem potasu- działania prewencyjne

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że Wojewoda Podkarpacki przekazał do gmin tabletki zawierające jodek potasu w celu ich szybkiej dystrybucji wśród mieszkańców **w momencie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.**

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że **w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje**, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Podkreśla także, że **profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.**

**Poniżej przekazujemy podstawowe informacje o zasadach przyjmowania leku znajdujące się w ulotce preparatu Jodku potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki, pozwolenie nr 20593 przekazanego dla Gminy Kolbuszowa od Wojewody Podkarpackiego:**

1. Jodek potasu stosowany jest w przypadku katastrof nuklearnych lub uszkodzeń reaktorów jądrowych w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę.
2. W trakcie uszkodzeń reaktorów jądrowych może dojść do emisji radioaktywnego jodu. W przypadku skażenia, radioaktywny jod wychwytywany jest przez tarczycę. Przyjęcie nie-radioaktywnego jodu (np. w postaci jodku potasu) zapobiega wychwytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę przed lub po wystąpieniu skażenia.
3. **Dawkowanie** - Tabletki zawierające **jodek potasu** należy przyjmować jedynie w przypadku katastrof jądrowych i **po komunikacie odpowiednich władz** za pośrednictwem radia lub telewizji. **Nie podejmować samodzielnie decyzji o przyjęciu leku.**
4. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony, lek należy przyjąć tak szybko jak to możliwe (najlepiej w ciągu 2 godzin) po ogłoszeniu, że wystąpiło skażenie radioaktywnym jodem. Jednakże, przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin po wystawieniu na działanie radioaktywnym jodem jest wciąż korzystne.
5. Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią, można rozkruszyć tabletki i rozprowadzić je w wodzie, syropie lub innym płynie. Całkowite rozpuszczenie tabletki może trwać do 6 minut. Należy upewnić się, że tabletki są całkowicie rozpuszczone przed podaniem jej dziecku.

**Po wydaniu stosownych dyspozycji przez Wojewodę Podkarpackiego** dystrybucja tabletek z jodkiem potasu będzie prowadzona

- w Kolbuszowej przez Przychodnię Rejonową nr 1 przy ul. Obrońców Pokoju oraz Przychodnię Rejonową nr 2 przy ul. Tyszkiewiczów.
- w sołectwach gminy przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Dodatkowe partie tabletek zostaną przekazane do rozdysponowania w szkołach i przedszkolach.